

Risk Studie



Risk factors associated with acute coronary syndrome in patients with acute chest pain

Doel: huidige protocol voor patiënten met cocaïne geassocieerde POB valideren
(patiënten waarbij een ACS wordt uitgesloten)

Inclusie: patiënt > 18 jaar, met pijn op de borst, cocaïne gebruik (anamnestisch of positieve urinetoxscreen)

Checklist:

	T= 0 uur	-urine toxscreen
	T= 0-1 uur	-volledige anamnese cardiaal en drugs (sneltekst .pobrisk) -informereren over studie en informed consent laten tekenen
cocaïne	T= + 1 uur	-1 uurs troponine T afnemen, opsturen naar lab indien patiënt daadwerkelijk positief test Verder beleid/diagnostiek zoals normaal

-Indien T = 0 representatieve 1^e troponines oplevert dan hoeft er geen troponine afgenomen te worden op T = 1, net zoals je dan ook geen troponine meer afneemt op T=3

-indien de patiënt ouder is dan 45 jaar wordt niet automatisch een toxscreen georderd, let daarbij extra goed op drugsgebruik in de anamnese, indien positieve anamnese voor cocaïne kan patiënt geïncludeerd worden

Bij vragen:

Ninke Barneveld Binkhuysen, N.N.BarneveldBinkhuysen@olvg.nl
Nanda Gubbels, N.P.Gubbels@olvg.nl,
f.m.j.gresnigt@olvg.nl, r.k.riezebos@olvg.nl