

Medische behandeling Covid-2019 verdachte patiënten

	Diagnostiek	Behandeling	Dispositie
Lichte klachten	Geen	Geen	Naar huis met een informatiefolder
Milde klachten en kan waarschijnlijk naar huis	GROOT intern lab X-thorax Influenza swab diep nasaal en keel Anamnese gericht op risicofactoren voor ernstiger verlopende infectie	Geen indicatie voor infusie met cristalloïden (tenzij) Antibiotica bij verdenking pneumonie volgens ziekenhuisprotocol, bij beeld van atypische verwekker overweeg doxycycline i.p.v. amoxicilline Alleen steroïden met een heel duidelijke indicatie (Dus COPD maar dan ook met een actieve exacerbatie)	Naar huis met een informatiefolder Laagdrempelig overleg met dd achterwacht interne geneeskunde of dd achterwacht longziekten Indien influenza swab positief, dan uitgaan van een corona negatieve patient
Heviger klachten en moet waarschijnlijk opgenomen worden	GROOT intern lab X-thorax Influenza swab diep nasaal en keel Corna kweken diep nasaal en keel	Bij infusie met cristalloïden duidelijke instructies t.a.v. de hoeveelheid. Max 500 cc per gift en daarna herevaluatie. Geen standaard afspraken Antibiotica bij verdenking pneumonie volgens ziekenhuisprotocol, bij twijfel naar boven afronden in AMBU score (dus laagdrempelig breder dekken) Alleen steroïden met een heel duidelijke indicatie (Dus COPD maar dan ook met een actieve exacerbatie)	Vroegtijdig aanmelden dat het een opnameindicatie betreft bij SEH arts Vroegtijdig aanmelden bij opname coördinator Opname na direct overleg met achterwacht, <i>standaard opname afspraken</i> zie bijlage
Kritiek zieke patiënten	GROOT intern lab X-thorax ECG, meten Qtc Influenza swab diep nasaal en keel Anamnese gericht op risicofactoren voor ernstiger verlopende infectie	Bij infusie met cristalloïden duidelijke instructies t.a.v. de hoeveelheid. Niet meer geven dan noodzakelijk. Antibiotica: Ceftriaxon 2000 mg en 400 mg ciprofloxacin Alleen steroïden met een heel duidelijke indicatie (Dus COPD maar dan ook met een actieve exacerbatie)	Vroegtijdig overleg met SEH arts dat het een kritiek zieke patient is Overweeg vroegtijdig intubatie (zie RSI bij corona patient)
Antivirale middelen	Chloroquine alleen bij bewezen Corona, dus zal zelfden vanaf de SEH gestart hoeven worden	Chloroquine verlengt de QT tijd, net als ciprofloxacin	
Hoofdbehandelaar	Opname bij longziekten bij onderliggende pulmonale pathologie	Opname bij interne geneeskunde als comorbidity of geriatrische patient	